

## **ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ**

88-20-004      Антитела класса G (IgG) к вирусу гепатита A (anti-HAV-IgG) (ПРОФ) ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

88-20-023      Комплексное исследование для скрининга инфекций «МультиСКРИН» (ВИЧ; HBsAg; anti-HCV; anti-Treponema pallidum) (ПРОФ) ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Кровь рекомендуется сдавать утром, натощак (не менее 8 и не более 14 часов голодания, можно пить негазированную воду). Накануне избегать пищевых перегрузок. Исключить физическое и эмоциональное перенапряжение и не курить 30 минут до сдачи крови.

88-20-066      ВИЧ-Комбо (HIV Ag/Ab Combo): антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов + антиген p24, методом ИФА (ПРОФ) ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую неминеральную и негазированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются. Внимание! При сдаче исследования АТ и АГ к ВИЧ 1, 2 типов для медицинского освидетельствования в соответствии с законодательством РФ обязательно предоставление документов и следующих данных: 1) Для жителей Москвы и Московской области: Фамилия, имя, отчество День, месяц и год рождения Сведения о регистрации Паспорт 2) Для жителей других регионов РФ и иностранных граждан дополнительно требуется ксерокопия или сканированная копия паспорта. Фамилия, имя, отчество День, месяц и год рождения Сведения о регистрации Паспорт Ксерокопия (скан) паспорта. При отсутствии паспорта пациент вправе оформить анонимную заявку для сдачи биоматериала. При анонимном обследовании, заявке и полученному от клиента образцу биоматериала присваивается номер, известный только пациенту и медперсоналу, оформлявшему заказ. Результаты исследований, выполненных анонимно, не могут быть представлены для госпитализации, профессиональных осмотров и не подлежат регистрации в ОРУИБ. Получить результаты анализов при анонимной сдаче возможно только лично при предъявлении чека.

88-20-067      Антиген s вируса гепатита В (HbsAg) (ПРОФ) ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую неминеральную и негазированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

88-20-068      Антитела к вирусу гепатита С (суммарные) (ПРОФ) ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую неминеральную и негазированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

88-20-069      Антитела Treponema pallidum (суммарные) (ПРОФ) ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

88-20-070      Антитела к вирусу гепатита А суммарные (ПРОФ)      ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ  
Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

88-20-071      Антитела к вирусу гепатита А IgM (ПРОФ)      ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ  
Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

88-20-072      Вирус гепатита В, суммарные антитела к поверхностному антигену (Anti-HBs),  
количественное определение (ПРОФ)      ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ  
Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

88-20-073      Реакция микропреципитации (RPR) (ПРОФ)      ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ  
Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

88-20-074      Сифилис РПГА (АТ к *Treponema pallidum*), антитела, реакция пассивной  
гемагглютинации (ПРОФ)      ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ  
Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

88-20-075      Антитела к Vi-антигену (брюшной тиф) (ПРОФ)      ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ  
Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

88-20-076      Антитела к возбудителю бруцеллеза (ПРОФ)      ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ  
Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

88-20-077      Антитела к вирусу кори IgG (Measles IgG) (ПРОФ)      ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ  
Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

88-20-078      Антитела к микобактериям туберкулеза (ПРОФ)      ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ  
Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

88-20-079      Антитела к дифтерийному анатоксину (ПРОФ)      ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ  
Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

88-20-081      Антитела к антигенам лямблий (сумм.) (ПРОФ)      ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ  
Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

89-20-001      СКРИН Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (*Toxoplasma Spp.*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови      ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ  
Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

89-20-002      СКРИН Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 (*Human immunodeficiency virus HIV 1/2*) и антигена p24 (*Agp24*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови      ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ  
Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

89-20-005      СКРИН Определение суммарных антител (IgM, IgG) к бледной трепонеме (*Treponema pallidum*) иммуноферментным методом (ИФА) в крови      ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ  
Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

89-20-023      СКРИН Подтверждающий тест для контроля специфичности определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) иммуноферментным методом (ИФА) в крови      ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ  
Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

89-20-026 СКРИН Определение суммарных антител (IgM, IgG) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) иммуноферментным методом (ИФА) в крови ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после небольшого приема пищи. Допустимо пить чистую неминеральную и негазированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

89-20-031 СКРИН Определение поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) иммуноферментным методом (ИФА) в крови ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после небольшого приема пищи. Допустимо пить чистую неминеральную и негазированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

89-20-055 СКРИН Определение наличия антител класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) иммуноферментным методом (ИФА) в крови, качественное исследование ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после небольшого приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

89-20-065 СКРИН Определение наличия антител класса M (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) иммуноферментным методом (ИФА) в крови, качественное исследование ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после небольшого приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

89-20-073 СКРИН Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест, микрореакция преципитации) ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после небольшого приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

89-20-074 СКРИН Антитела к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) реакцией пассивной гемагглютинации (РПГА) ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после небольшого приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

89-20-075 СКРИН Антитела к Vi-антигену возбудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) (Скрин)ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после небольшого приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

89-20-076 СКРИН Антитела к возбудителю бруцеллеза (*Brucella* spp.) ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

89-20-077 СКРИН Антитела класса G (IgG) к вирусу кори (Measles) ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

89-20-078 СКРИН Антитела к микобактериям туберкулеза (*Mycobacterium tuberculosis*) (Скрин) ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

89-20-079 СКРИН Суммарные антитела к возбудителю дифтерии (*Corynebacterium diphtheriae*) ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

89-20-080 СКРИН Определение наличия антител класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) иммуноферментным методом (ИФА) в крови, количественное исследование ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

89-20-081 СКРИН Суммарные антитела к возбудителю лямблиоза (*Giardia lamblia*) ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

97-13-200 Диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции методом T-SPOT.TB в крови ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после необильного приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются. Накануне избегать переедания, физической нагрузки и эмоционального перенапряжения. ВАЖНО: • Проба Манту не влияет на результат исследования для диагностики туберкулезной инфекции методом ELISPOT, поэтому его можно проводить независимо от постановки пробы. • После Диаскин-теста, данное исследование можно проводить не ранее, чем

через 2 месяца. • Во время ОРЗ может отмечаться неспецифическая реакция, которая мешает оценке результата. Поэтому предпочтительно делать тест не ранее, чем через 1 месяц после выздоровления.

97-13-201 Квантифероновый тест (диагностика туберкулеза) ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ

Исследование проводится не ранее чем через 1-2 недели после вакцинации и при отсутствии клинических проявлений ОРВИ. За 1 -2 суток исключить физические нагрузки прием алкоголя. За 2 часа до сдачи крови исключить табакокурение. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 8 часов после небольшого приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.

97-20-200 Ат к Vi-антигену (брюшной тиф), РПГА ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ

Специальной подготовки к исследованию не требуется. Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после небольшого приема пищи. Допустимо пить чистую не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещаются.